

전지적 술자 시점 : 같거나 다르거나

창 동 옥 / 원치과

김 용 진 / 예스미르치과

Dr. Rokas Kuprys / PIC(Panevėžio Implantologijos Centras) Clinic (Lithuania)

임플란트 식립 시 동반되는 대표적인 부가적인 수술은 상악동 거상술과 치조제 증강술일 것입니다. 상악동의 함기화로 인해 상악 구치부 임플란트 식립을 위해 상악동 거상술이 대부분의 경우에 필요하게 됩니다. 상악동에 대한 접근법은 크게 치조정 접근법과 측방 접근법으로 나눌 수 있으며 대부분 잔존골의 높이에 따라 접근방법을 결정하게 됩니다. 또한 무치악 부위에서 수직적, 수평적 골 결손은 임플란트 식립 시 어려움을 야기하게 됩니다. 골 결손 부위에 임플란트 식립 시 임플란트 주위의 적절한 골 지지를 얻기 위한 치조골 증강술은 성공적인 임플란트 치료를 위한 필수적인 기법으로 사료되고 있으며 다양한 치조골 증강술식이 소개되어 왔습니다. 실제 임상에서는 입자형 골이식재와 차폐막을 이용한 골유도재생술 즉, Guide Bone Regeneration(GBR)이 주로 사용되고 있지만 심하게 퇴축된 치조제의 경우에는 block bone graft 혹은 Titanium mesh를 이용한 골증강술을 고려하여야 합니다.

본 강연에서는 각 술자의 임상적 경험을 바탕으로 정립된 상악동 거상술과 치조제 증강술의 치료 프로토콜을 공유하고자 합니다.

학력 및 경력

창동옥

- * 경희대학교 치과대학 졸업
- * 경희대학교 치과대학병원 치주과 전공의 수료
- * 경희대학교 치의학 전문대학원 외래교수
- * 치주과 전문의
- * 대한치주과학회 인정의
- * 현, 원치과의원 원장

김용진

- * 단국대학교 치과대학 졸업
- * 서울아산병원 구강악안면외과 레지던트
- * 구강악안면외과 전문의
- * 악안면성형재건외과학회 인정의
- * 미국 메릴랜드대학교 치과대학 Dean's faculty
- * 현, 예스미르치과 원장

Dr.Rokas Kuprys

구강외과 전문의

- * 국제 연자
- * 리투아니아 파네베지스 임플란트 센터 소속
- * MINEC Knight 및 구강악안면외과 학회 회원
- * 가이드 수술, 임플란트, 연조직 및 경조직 관리 분야 전문